


Dosificación de Zithromax® Polvos para Suspensión Oral (PSO) y Tabletas basada en talla y peso

Julio de 2018



*Nota: Aun cuando el individuo es mayor de 7 años y lo suficientemente alto para que se le suministre una tableta, si hay alguna preocupación de que él o ella pueda tener problemas para tragar una tableta, se le deberá proporcionar el PSO

Guías de dosificación de Zithromax®

Julio de 2018

Dosificación por grupo poblacional para la Administración Masiva de Medicamentos (AMM) contra el tracoma	
Grupo meta para MDA	Formulación
Niños de 0 a 6 meses	Tetraciclina ungüento ocular
Niños en edades entre 6 meses y 7 años (independientemente de su talla) Individuos por debajo de 120cm (independientemente de su edad) Individuos con dificultad para tragar tabletas o incomodos tomando tabletas	Polvo para suspensión oral (PSO) dosificadas de acuerdo con la talla
Individuos más de 120 cm de estatura y en edades entre 7 y 15 años Individuos con 15 años o más	Tabletas dosificadas de acuerdo con la talla Dosis de 4 tabletas
Tratando niños con Zithromax®	
Ningún niño debe ser forzado a tomar Zithromax®.	
Los lugares de distribución pueden ser intimidantes para los niños. Si el niño no coopera o está ansioso, el padre o tutor es la persona correcta para administrar el Zithromax® al niño para disminuir su ansiedad.	
Si un niño no coopera o está ansioso, el distribuidor debe instruir a los padres a llevar al niño a un lugar más tranquilo para administrarle la dosis con calma a la vista del distribuidor.	
Mientras administra el Zithromax® a un niño, NUNCA le tape la nariz, sacuda al niño o fuerce la cabeza hacia atrás para obligarlo a tragar.	
Si el niño se resiste, el distribuidor deberá registrar que el niño rehusó y pasar a la siguiente persona en la fila.	
Aun cuando el niño sea mayor de 7 años y lo suficientemente alto para suministrarle una tableta, si existe alguna preocupación de que el niño pueda tener dificultad para tragar la tableta, se le deberá proporcionar la suspensión oral (PSO).	

META

CERO EVENTOS ADVERSOS SERIOS DEBIDO A ASFIXIA

META

MEJOR MENEJO DE TRATAMIENTOS A NIÑOS