


DOSAGES DE ZITHROMAX[®] EN POUDRE POUR SUSPENSION BUVALE ET EN COMPRIMÉS, EN FONCTION DE LA TAILLE ET DE L'ÂGE

Juillet 2018



*Remarque : Même si le patient a plus de 7 ans et est assez grand pour recevoir un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l'on a la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU DOSAGE DU ZITHROMAX[®]

Juillet 2018

DOSAGE PAR GROUPE DE POPULATION POUR LES TDM CONTRE LE TRACHOME

Groupe ciblé par l'TDM	Formulation
Enfants âgés de 0 à 6 mois	Pommade ophtalmique à la tétracycline
Enfants âgés de 6 mois à 7 ans (quelle que soit la taille) Quiconque mesure moins de 120 cm (quel que soit l'âge) Quiconque a des difficultés à avaler des comprimés ou que la prise de comprimés met mal à l'aise	Suspension buvable en poudre dosée en fonction de la taille
Quiconque mesure plus de 120 cm <u>et</u> est âgé entre 7 et 15 ans	Comprimés dosés en fonction de la taille
Quiconque a 15 ans ou plus	Dose de 4 comprimés

TRAITEMENT DES ENFANTS PAR ZITHROMAX[®]

Aucun enfant ne doit être forcé à prendre du Zithromax[®]

Les sites de distribution peuvent être intimidants pour des enfants. Si l'enfant ne coopère pas ou est anxieux, le parent ou le tuteur est la personne qui convient pour administrer le Zithromax[®] à l'enfant en atténuant son anxiété.

Si l'enfant ne coopère pas ou est anxieux, l'administrateur du traitement doit dire au parent d'emmener l'enfant dans un lieu plus tranquille où l'on pourra administrer la dose calmement, sous le regard de l'administrateur du traitement.

Lorsqu'on administre le Zithromax[®] à un enfant, NE JAMAIS lui boucher le nez, le secouer ou l'obliger à basculer sa tête en arrière pour le forcer à avaler.

Si l'enfant résiste, l'administrateur du traitement doit déclarer que l'enfant a refusé le traitement et passer à la personne suivante.

Même si l'enfant a plus de 7 ans et est assez grand pour prendre un comprimé, il doit recevoir la suspension buvable en poudre si l'on a la moindre inquiétude sur sa capacité à avaler un comprimé.

BUT
AUCUNE EFFET INDÉSIRABLE GRAVE DUE À UNE SUFFOCATION

BUT
MEILLEURE GESTION DES TRAITEMENTS ADMINISTRÉS AUX ENFANTS