

تحديد الجرعات لعقار زيثروماكس® Zithromax® المحلول الفموي و الأقراص بناءً على الطول و العمر

الاطفال الرضع دون 6 أشهر: مرهم TEO (مرهم تتراسيكلين للعين)

المحلول الفموي POS (مسحوق المحلول الفموي)
الجرعات (مل) الطول (سم)

الاطفال ≤ 6 أشهر و > 7 سنوات يتلقون المحلول الفموي

الأقراص
الطول (سم)

الاطفال ≤ 7 سنوات و > 15 سنة يتلقون الأقراص

≤ 15 سنة : 4 أقراص




رضيع

138 <	25 مل
138 - 130 <	19 مل
130 - 122 <	16 مل
122 - 110 <	14 مل
110 - 98 <	12 مل
98 - 87 <	10 مل
87 - 76 <	8 مل
76 - 65 <	6 مل
65 - 54 <	4 مل
54 - 50 <	2 مل



طفل

138 <	4 أقراص
138 - 120	3 أقراص



مُراهق



بالغ

* ملاحظة: حتى إذا كان عمر الشخص و على الأقل 7 سنوات و طويل القامة بما يكفي ليُعطى أقراص، فإذا وُجدت أي مؤشرات على أنه قد تكون لديه صعوبة في بلع الأقراص، حينها يجب ان يُعطى المحلول الفموي.

إرشادات جرعات عقار زيثروماكس® Zithromax®

يناير/2020م

إعطاء جرعات دواء التراخوما جماعياً وفقاً للفئة السكانية

الفئة المستهدفة عند إعطاء دواء التراخوما جماعياً
الأطفال بعمر 0 - 6 أشهر

المستحضر الدوائي
مرهم تتراسيكلين للعين (TEO)

الاطفال بعمر ≥ 6 أشهر إلى < 7 سنوات (بغض النظر عن طول القامة)

تُحدد جرعة المحلول الفموي (POS) وفقاً للطول

الأفراد الذين يقل طول قامتهم عن 120 سم (بغض النظر عن العمر)

الأفراد الذين قد تكون لديه صعوبة في بلع الأقراص أو لا يرتاحون لتناولها.

الأفراد الذين يزيد طول قامتهم عن 120 سم و تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 15 سنة

تُحدد جرعة الأقراص وفقاً لطول القامة
جرعة من 4 أقراص

الأفراد الذين عمرهم 15 سنة و ما فوق

علاج الأطفال بعقار زيثروماكس®

لا يجب إجبار أي طفل على تناول عقار زيثروماكس®

أماكن التوزيع قد تكون مُخيفة للأطفال. فإذا كان الطفل غير متعاون أو قلق، يكون أحد الوالدين أو الوصي عليه هو الشخص المناسب لإعطاء عقار زيثروماكس® للطفل و تخفيف قلقه.

إذا كان الطفل غير متعاون أو قلق، يجب على الموزع ان يُرشد الوالدين بأخذ الطفل لموقع أكثر هدوءاً لإعطائه الجرعة بهدوء، و على مرأى من الموزع.

أثناء إعطاء عقار زيثروماكس® لطفل، أبداً لا يجوز إغلاق أنف الطفل، هزّ الطفل، أو إمالة رأسه الى الخلف عنوة لإجبارة على

الابتلاع.

إذا قاوم الطفل، يجب على الموزع تسجيل الطفل على أنه رفض و الإنتقال الى الشخص التالي في الصف.

حتى إذا كان الطفل عمره أكبر من 7 سنوات و طويل القامة بما يكفي ليُعطى أقراص، فإذا وُجدت أي مؤشرات على أنه قد تكون لديه صعوبة في بلع الأقراص، حينها يجب ان يُعطى المحلول الفموي.

الهدف

إنعدام الأحداث السالبة الخطرة الناتجة عن الاختناق

الهدف

الادارة الأفضل لعلاجات الأطفال