

Dosagem dos comprimidos e suspensão oral em pó (SOP) de Zithromax® Baseada na Altura e Idade

Julho de 2018

Bebés com menos de 6 meses: TPO
(Tetraciclina em Pomada Oftálmica)



Bebé

SOP (Suspensão Oral em Pó)	
Altura (cm)	Dosagem (ml)
> 138	25 ml
> 130-138	19 ml
> 122-130	16 ml
> 110-122	14 ml
> 98-110	12 ml
> 87-98	10 ml
> 76-87	8 ml
> 65-76	6 ml
> 54-65	4 ml
50-54	2 ml

Crianças ≥ 6 meses e < 7 anos de idade a receberem SOP (Suspensão Oral em Pó) *



Criança

Comprimidos Altura (cm)	
> 138	4 comprimidos
120 - 138	2 comprimidos

Crianças ≥ 7 anos de idade e < 15 anos de idade a receberem comprimidos



Adolescente

≥ 15 anos de idade : 4 comprimidos



Adulto

*Observação: Mesmo que o indivíduo tenha pelo menos 7 anos de idade e seja alto o suficiente para receber um comprimido, se houver alguma preocupação de que ele/a possa vir a ter problemas para engolir um comprimido, deve-lhe ser oferecido o SOP (Suspensão Oral em Pó).

Directrizes para a dosagem de Zithromax®

Julho de 2018

OBJETIVO

(ZERO) EFEITOS
ADVERSOS GRAVES
DEVIDO AO
ENGASGAMENTO

OBJETIVO

MELHOR GESTÃO DOS
TRATAMENTOS PARA
CRIANÇAS

DOSAGEM POR GRUPO DE POPULAÇÕES PARA AS AMM* DE TRACHOMA

Grupo Alvo de AMM*	Indicação
Crianças de 0 a < 6 meses	Tetraciclina em Pomada Oftálmica (TPO)
Crianças de ≥ 6 meses a < 7 anos de idade (independentemente da altura) Indivíduos com menos de 120 cm (independentemente da idade) Indivíduos com dificuldades em engolir comprimidos ou desconfortáveis para tomar comprimidos	SOP (Suspensão Oral em Pó) dosagem de acordo com a altura
Indivíduos com mais de 120 cm e entre idades de ≥ 7 a < 15 anos de idade.	dosagem do comprimido de acordo com a altura
Indivíduos com 15 anos de idade ou maiores	dose de 4 comprimidos

TRATAR CRIANÇAS COM ZITHROMAX®

Nenhuma criança deve ser forçada a ser administrada o Zithromax®.
Os sítios de distribuição podem ser intimidantes para as crianças. Se a criança não for cooperativa ou estiver ansiosa, o parente ou guardião é a pessoa correta para administrar o Zithromax® à criança para reduzir a ansiedade da criança.
Se a criança não for cooperativa ou estiver ansiosa, o distribuidor deve instruir o parente a levar a criança a um local mais calmo para administrar a dose com calma, sob supervisão do distribuidor.
Ao administrar o Zithromax® a uma criança, NUNCA segure o nariz da criança, agite a criança ou force a sua cabeça para trás para forçar a criança a engolir.
Se a criança resistir, o distribuidor deve registar a criança como se tivesse recusado e deve passar para a próxima pessoa na fila.
Mesmo que o indivíduo tenha pelo menos 7 anos de idade e seja alto o suficiente para receber um comprimido, se houver alguma preocupação de que ele/a possa vir a ter problemas para engolir um comprimido, deve-lhe ser oferecido o SOP (Suspensão Oral em Pó).

* AMM (Administração de Medicamentos em Massa)